

AZILECT® — Monoterapia en la enfermedad de Parkinson

eDetailing Veeva CLM · Guía de entrega

Producto: AZILECT® (rasagilina) 1 mg · Cliente: Teva · Mercado: España · Plataforma: Veeva CLM (iPad) · 10 diapositivas + 1 ventana · 31 de julio de 2026

1. Qué se entrega

Presentación interactiva (eDetailing) de **AZILECT®** para uso en visita médica a través de **Veeva CLM** en iPad. Código del material: `AZI-ES-00064 JULIO 2026`.

10 archivos ZIP, uno por diapositiva. Cada ZIP contiene el `index.html` en la **raíz** y sus recursos (`css/` , `js/` , `images/`). **El nombre del ZIP es el identificador de la diapositiva en Veeva**, así que no debe cambiarse: la navegación entre pantallas se hace por ese nombre.

El **algoritmo de tratamiento** no es una diapositiva: va **dentro** de la diapositiva 04, como ventana superpuesta. Por eso se entregan 10 ZIPs y no 11.

Orden	Archivo ZIP	Área	Contenido
1	<code>Azilect-Monoterapia_01.zip</code>	Portada	Portada animada: el logotipo, el sello de Teva y el botón COMENZAR entran al abrir
2	<code>Azilect-Monoterapia_02.zip</code>	Indicación	Indicación y recomendaciones de guías — es el destino del botón home
3	<code>Azilect-Monoterapia_03.zip</code>	Caso clínico	«Pedro, 62 años»
4	<code>Azilect-Monoterapia_04.zip</code>	Guías SEN	Monoterapia en las guías SEN, con el algoritmo de tratamiento en ventana superpuesta
5	<code>Azilect-Monoterapia_05.zip</code>	Eficacia 1/3	Eficacia en monoterapia
6	<code>Azilect-Monoterapia_06.zip</code>	Eficacia 2/3	Eficacia en monoterapia
7	<code>Azilect-Monoterapia_07.zip</code>	Eficacia 3/3	Eficacia en monoterapia
8	<code>Azilect-Monoterapia_08.zip</code>	Seguridad	Perfil de seguridad
9	<code>Azilect-Monoterapia_09.zip</code>	Posología	Posología y forma de administración

10	Azilect-Monoterapia_10.zip	Resumen	Cierre con cuatro accesos a las secciones
----	----------------------------	---------	---

2. Cómo se navega

- **Portada:** sobre el fondo, el logotipo de AZILECT®, el sello de Teva y el botón **COMENZAR** entran al abrir (unos 3,9 segundos en total). El botón da un par de latidos para señalar por dónde se empieza. A diferencia de otras portadas, aquí **solo el botón COMENZAR avanza**: tocar en cualquier otro sitio no hace nada, como indica el arte.
- **Menú superior** (diapositivas 04 a 09): cuatro pestañas — Guías SEN, Eficacia, Seguridad y Posología — que llevan siempre a la **primera** pantalla de su sección.
- **Flechas laterales:** anterior y siguiente, correlativas.
- **Ventana del algoritmo** (diapositiva 04): se abre a pantalla completa con un fundido de 0,75 s y se cierra con la X; un toque dentro de la tarjeta no la cierra.
- **Cabecera: FT** abre la ficha técnica de AZILECT® en la web de la AEMPS, en ventana externa, y **home** vuelve a la **diapositiva 02** — no a la portada. En la propia 02 el icono de home está dibujado en el arte pero no responde al toque, porque ya estás en su destino.
- **Resumen** (diapositiva 10): cuatro accesos directos a las secciones.

3. Qué se mide (tracking)

Cada interacción queda registrada en Veeva mediante `com.veeva.clm.trackEvent(etiqueta, valor)`. La tabla siguiente está **extraída directamente de los archivos entregados**, no transcrita a mano.

Pendiente de validación por Teva: las etiquetas son propuesta nuestra. El PDF define la navegación, pero no los nombres de evento. Si Teva prefiere otra nomenclatura, se cambia antes de publicar en Veeva.

Zona	Etiqueta (label)	Valor	Destino	Dónde
Botón dentro del contenido	Caso clínico - cómo puede ayudar AZILECT	Click	Azilect-Monoterapia_02	01
Ficha técnica (cabecera)	Ficha Técnica - AZILECT	Click	ficha técnica en la AEMPS (ventana externa)	9 diapositivas (02-10)
Botón dentro del contenido	Indicación - ampliar	Click	Azilect-Monoterapia_03	02
Home (cabecera)	BTN_Home_Click	Click	Azilect-Monoterapia_02	8 diapositivas (03-10)
Flecha siguiente	BTN_adelante_Click	Click	la diapositiva siguiente	7 diapositivas (03-09)
Botón dentro del contenido	Caso clínico - cómo puede ayudar AZILECT	Click	Azilect-Monoterapia_04	03

Menú superior	Menú superior – Guías SEN	Click	Azilect-Monoterapia_04	6 diapositivas (04–09)
Menú superior	Menú superior – Seguridad	Click	Azilect-Monoterapia_08	6 diapositivas (04–09)
Menú superior	Menú superior – Posología	Click	Azilect-Monoterapia_09	6 diapositivas (04–09)
Menú superior	Menú superior – Eficacia	Click	Azilect-Monoterapia_05	6 diapositivas (04–09)
Icono del algoritmo	Algoritmo EP inicial (guía SEN)	Abre pop-up	abre la ventana del algoritmo	04
Flecha anterior	BTN_atras_Click	Click	la diapositiva anterior	6 diapositivas (04–09)
Botón X de la ventana	BTN_PopUp_Cerrar_Click	Click	cierra la ventana	04
Resumen final	Resumen – Guías SEN	Click	Azilect-Monoterapia_04	10
Resumen final	Resumen – Eficacia	Click	Azilect-Monoterapia_05	10
Resumen final	Resumen – Seguridad	Click	Azilect-Monoterapia_08	10
Resumen final	Resumen – Posología	Click	Azilect-Monoterapia_09	10

4. Lo que hemos dejado fuera a propósito

Tres detalles anotados en el PDF que **no se han montado**, y que conviene que Teva confirme. No están borrados: siguen en el código, desactivados, y se reactivan en un momento.

Zona	Etiqueta (label)	Valor	Destino	Dónde
Home (cabecera)	BTN_Home_Click	Click	Azilect-Monoterapia_02	02
Referencia del pie	Guía SEN 2024	Click	guía de la SEN (ventana externa)	04, 04

- **Los enlaces de las referencias del pie** (guía SEN, en la diapositiva 04 y en su ventana): en nuestros eDetailings las referencias del pie no llevan hipervínculo. Es criterio nuestro, no del arte.
- **El home de la diapositiva 02**: el home lleva precisamente a la 02, así que ahí ese botón recargaría la pantalla en la que ya estás y registraría un clic que no ha llevado a ninguna parte.

Además, en la **página 7 del PDF** los bocadillos de las flechas están cruzados (la de la izquierda dice «Siguiente diapo» y la de la derecha «Diapo anterior»). Se ha respetado la **posición**, que es lo que espera el usuario: izquierda retrocede y derecha avanza. Es la única pantalla donde ocurre.

5. Notas técnicas

- Cada diapositiva carga las librerías oficiales de Veeva (`MyInsightsLibrary.js` y `q.js`).
- Optimizado para Safari iPad / Veeva WebView, en **orientación horizontal**. Arte a 2048 × 1536 px (densidad retina).
- Cada ZIP es autónomo y su nombre es el identificador de navegación en Veeva.
- Implementación de **fondo + zonas activas**: el arte trae quemados los estados, así que lo que se ve es exactamente el arte aprobado.
- La animación de la portada respeta la preferencia de *reducir movimiento* del sistema: si el iPad la tiene activada, la portada se muestra completa desde el primer momento.

6. Capturas de pantalla

Reproducción de las **10 diapositivas** en orden, más la **ventana del algoritmo**.

1. Azilect-Monoterapia_01 — Portada



2. Azilect-Monoterapia_02 — Indicación

Acceso a
Ficha Técnica
Azilect 1 mg



AZILECT® (rasagilina) está **indicado** en adultos para el tratamiento de la enfermedad idiopática de Parkinson en:¹

MONOTERAPIA
(sin levodopa)¹



TERAPIA COADYUVANTE
(con levodopa)¹

*en pacientes con fluctuaciones
de final de dosis¹*

Según algunas guías, rasagilina está recomendada en pacientes con:

Enfermedad de
Parkinson de novo²



Leve afectación
funcional menores de
70 años²



Fluctuaciones motoras
durante la monoterapia
con levodopa²



Limitaciones
relacionadas con la
seguridad³



Sociedad Alemana
de Neurología

Según la **última guía de la SEN**, rasagilina está recomendada con el máximo nivel de recomendación (grado A) en **ambas terapias**^{2*}



*Grado de recomendación A: recomendación muy robusta. Intervención claramente efectiva, útil o altamente predictiva en las condiciones especificadas y para una población determinada. Al menos un estudio concluyente de nivel I o 2 estudios convincentes de nivel II.

SEN: Sociedad Española de Neurología.

1. Ficha técnica de Azilect®. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/04304004/FT_04304004.html. Último acceso: julio 2026. 2. Manual de práctica clínica en la enfermedad de Parkinson. Recomendaciones diagnóstico-terapéuticas de la SEN 2024. Disponible en: <https://www.sen.es/pdf/2025/GuiaParkinson2024.pdf>. Último acceso: julio 2026. 3. Höglinger G. German Parkinson's Guidelines Committee, Trenkwalder C. Diagnosis and treatment of Parkinson's disease (guideline of the German Society for Neurology). Neurol Res Pract. 2024;6(1):30.



3. Azilect-Monoterapia_03 — Caso clínico

Acceso a
Ficha Técnica
Azilect 1 mg

FT



MONOTERAPIA

Enfermedad de Parkinson en fase temprana



*Paciente ficticio

Pedro 62 años

Anamnesis

- Hipertensión arterial controlada
- Trastorno leve de ansiedad (en seguimiento, sin tratamiento actual)

Refiere alta preocupación por mantener su rendimiento laboral y autonomía

Sintomatología

- Inicio insidioso, progresivo en los últimos 6–8 meses
- Temblor en reposo en mano derecha, bradicinesia leve (lentitud en tareas finas, escritura más pequeña), rigidez leve unilateral

Impacto funcional leve, pero ya perceptible en su día a día



Diagnóstico

*Enfermedad de Parkinson idiopática en fase inicial
Paciente de novo, sin exposición previa a tratamiento dopaminérgico
Síntomas motores leves, unilateral predominante*



**Cómo podría ayudar Azilect® en el tratamiento
de la enfermedad de Parkinson en este paciente**



teva

4. Azilect-Monoterapia_04 — Guías SEN



Acceso a
Ficha Técnica
Azilect 1 mg

FT



MONOTERAPIA

GUÍAS SEN

EFICACIA

SEGURIDAD

POSOLOGÍA

¿Qué indica la guía de la SEN para el tratamiento de la EP inicial?¹

El uso precoz de LD en EP inicial

podría influir en la presencia de **complicaciones motoras**, especialmente en la aparición de **discinesias y fluctuaciones motoras**, especialmente en **pacientes jóvenes**¹

Para la EP inicial con leve afectación funcional

se puede iniciar el tratamiento sintomático con **IMAO-B o AD (< 70 años)** (grado de recomendación A). Su uso ofrece un efecto sintomático leve y permite **retrasar la necesidad de añadir otros fármacos dopaminérgicos**¹

La rasagilina

es un fármaco de **cómoda posología y en general adecuadamente tolerado**, con efecto demostrado en EP inicial¹

Algoritmo de tratamiento de la EP inicial según la guía de la SEN




*Grado de recomendación A: recomendación muy robusta. Intervención claramente efectiva, útil o altamente predictiva en las condiciones especificadas y para una población.¹

AD: agonistas dopaminérgicos; EP: Enfermedad de Parkinson; IMAO-B: inhibidores de la monoaminoxidasa B; LD: levodopa; SEN: Sociedad Española de Neurología.

1. Manual de práctica clínica en la enfermedad de Parkinson. Recomendaciones diagnóstico-terapéuticas de la SEN 2024. Disponible en: <https://www.sen.es/pdf/2025/GuiaParkinson2024.pdf>. Último acceso: julio 2026.



5. Azilect-Monoterapia_05 — Eficacia 1/3



6. Azilect-Monoterapia_06 — Eficacia 2/3



7. Azilect-Monoterapia_07 — Eficacia 3/3

Acceso a
Ficha Técnica
Azilect 1 mg

FT

MONOTERAPIA

GUÍAS SEN

EFICACIA

SEGURIDAD

POSOLÓGIA

**AZILECT® EN MONOTERAPIA redujo significativamente
síntomas no motores:^{1*}**

FATIGA

**SÍNTOMAS
NO
MOTORES**

ALTERACIONES
COGNITIVAS

Tuvo efectos
beneficiosos en
aspectos
relacionados con la
atención y las
funciones ejecutivas
en pacientes con
alteraciones cognitivas
sin demencia^{1*}

**Test neuropsicológicos
AZILECT® 1 mg vs. placebo en
la semana 12**

**Mejor retención de
dígitos en orden inverso**
P=0,04^{1*}

Mayor fluidez verbal
P=0,038^{1*}

**Mejora de Z scores en el
dominio cognitivo**
P<0,005^{1*}

AZILECT®
rasagilina

1mg
vs.
al día

*Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico en el que se incluyeron pacientes con enfermedad de Parkinson con déficit cognitivo, pero sin demencia. De los 55 pacientes aleatorizados completaron el estudio 23 en el grupo de rasagilina 1 mg/día y 25 en el grupo de placebo.¹

1. Hanagasi HA, et al. The effects of rasagiline on cognitive deficits in Parkinson's disease patients without dementia: a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study. Mov Disord. 2011;26(10):1851-1858.

teva

8. Azilect-Monoterapia_08 — Seguridad

Acceso a
Ficha Técnica
Azilect 1 mg



MONOTERAPIA

GUÍAS SEN

EFICACIA

SEGURIDAD

POSOLÓGIA

AZILECT® EN MONOTERAPIA

mostró un perfil de seguridad comparable a placebo^{1*}

Los efectos adversos no se produjeron con mayor frecuencia en los pacientes que recibieron rasagilina que en los que recibieron placebo^{1*}

Eventos adversos por grupo de tratamiento:^{1#}

	Grupo placebo	Rasagilina 1 mg/día
Cualquier acontecimiento	110 (79,7%)	109 (81,3%)
Cualquier acontecimiento (moderado o grave)	63 (45,7%)	58 (43,3%)
Infección	22 (15,9%)	20 (14,9%)
Cefalea	14 (10,1%)	19 (14,2%)
Lesión accidental	14 (10,1%)	10 (7,5%)
Mareo	15 (10,9%)	9 (6,7%)
Astenia [†]	15 (10,9%)	6 (4,5%)
Náuseas	10 (7,2%)	7 (5,2%)
Artralgia	6 (4,3%)	5 (3,7%)
Dolor de espalda	7 (5,1%)	7 (5,2%)
Dolor	8 (5,8%)	8 (6,0%)



*Estudio multicéntrico, internacional y aleatorizado. Se incluyeron 138 pacientes en el grupo de placebo y 134 en el grupo de Azilect® 1 mg/día.¹

[†]Los datos se presentan como número (porcentaje) de pacientes. Las diferencias entre grupos no fueron estadísticamente significativas, salvo que se indique lo contrario.¹

¹p=0,05 para la diferencia entre placebo y cada uno de los grupos de tratamiento individuales.¹

1. Parkinson Study Group. A controlled trial of rasagiline in early Parkinson disease: the TEMPO Study. Arch Neurol. 2002;59(12):1937-1943.

teva

9. Azilect-Monoterapia_09 — Posología

Acceso a
Ficha Técnica
Azilect 1 mg

FT



MONOTERAPIA

GUÍAS SEN

EFICACIA

SEGURIDAD

POSOLOGÍA

Posología y directrices de administración:



1 mg



1 vez al día



con o sin alimentos

1mg
vez
al día

Dosis única

- ✓ La dosis recomendada de Azilect® es **de 1 mg (un comprimido) una vez al día**¹
- ✓ Cómoda posología según la guía de la SEN²
- ✓ Puede tomarse con o sin alimentos¹

Poblaciones especiales

- ✓ No es necesario ajustar ni cambiar la dosis en pacientes de edad avanzada ni en pacientes con insuficiencia renal^{1*}



*Contraindicado en insuficiencia hepática grave. El uso de rasagilina debe evitarse en pacientes con insuficiencia hepática moderada. Hay que tener una precaución especial al iniciar un tratamiento con rasagilina en pacientes con insuficiencia hepática leve.¹

SEN: Sociedad Española de Neurología.

1. Ficha técnica de Azilect®. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/04304004/FT_04304004.html. Último acceso: julio 2026. 2. Manual de práctica clínica en la enfermedad de Parkinson. Recomendaciones diagnóstico-terapéuticas de la SEN 2024. Disponible en: <https://www.sen.es/pdf/2025/GuiaParkinson2024.pdf>. Último acceso: julio 2026.

teva

10. Azilect-Monoterapia_10 — Resumen



Acceso a
Ficha Técnica
Azilect 1 mg

FT





GUÍAS SEN



✓ Rasagilina cuenta con recomendación Grado A (guía de la SEN 2024) en **monoterapia en pacientes con EP de novo**¹



EFICACIA



✓ Mejoró significativamente la puntuación total en la escala UPDRS frente a placebo a las 26 semanas^{2*}

✓ **Redució significativamente** la progresión de la fatiga en pacientes con enfermedad inicial^{3#}

✓ Tuvo efectos beneficiosos en la **atención y las funciones ejecutivas**^{4†}



SEGURIDAD



✓ Perfil de seguridad comparable a placebo^{2*}



POSOLÓGIA



✓ Dosis única, una vez al día⁵

✓ De cómoda posología según la guía de la SEN¹



Acceso a Ficha técnica de Azilect®
Azilect® 1 mg 30 comprimidos, PVP IVA: 91,32 €.

CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta médica.
Aportación del beneficiario especial. Financiado por el Sistema Nacional de Salud.

*Estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo de 26 semanas de duración. De un total de 404 pacientes, se incluyeron 138 en el grupo de placebo y 134 en el grupo de AZILECT® 1 mg/día (mejora significativa de la puntuación total UPDRS frente a placebo; P<0.001).¹ *Subestudio de la fase doble ciego controlada con placebo (36 semanas) del ensayo ADAGIO. Se aleatorizaron 1.105 pacientes con enfermedad de Parkinson temprana no tratados, comparando, entre otros, el grupo de rasagilina 1 mg/día (n = 270) frente a placebo (n = 558).² †Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico en el que se incluyeron pacientes con enfermedad de Parkinson con déficit cognitivo, pero sin demencia. De los 55 pacientes aleatorizados completaron el estudio 23 en el grupo de rasagilina 1 mg/día y 25 en el grupo de placebo.⁴

EP: enfermedad de Parkinson; SEN: Sociedad Española de Neurología; UPDRS: Unified Parkinson's Disease Rating Scale.

1. Manual de práctica clínica en la enfermedad de Parkinson. Recomendaciones diagnóstico-terapéuticas de la SEN 2024. Disponible en: <https://www.sen.es/pdf/2025/GuiaParkinson2024.pdf>. Último acceso: junio 2026. 2. Parkinson Study Group. A controlled trial of rasagiline in early Parkinson disease: the TEMPO Study. Arch Neurol. 2002;59(12):1937-1943. 3. Stocchi F, ADAGIO investigators. Benefits of treatment with rasagiline for fatigue symptoms in patients with early Parkinson's disease. Eur J Neurol. 2014;21(2):357-360. 4. Hanagasi HA, et al. The effects of rasagiline on cognitive deficits in Parkinson's disease patients without dementia: a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study. Mov Disord. 2011;26(10):1851-1858. 5. Ficha técnica de Azilect®. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/04304004/FT_04304004.html. Último acceso: junio 2026.



Ventana — Algoritmo de tratamiento de la EP inicial (guía SEN)

se abre desde la diapositiva 04



Cualquier ajuste de contenido, enlaces o etiquetas de tracking debe solicitarse antes de la publicación en Veeva. El contenido médico, los claims y las referencias son responsabilidad del cliente / regulatorio.